

Montsan® 200ULV مونتسان

ULV

/ % Carbosulfan :

سام



Toxic

أبعد المبيد عن تناول الأطفال

عند الإبتلاع: ينقل المصاب بسرعة إلى المستشفى، ويجب عدم إحداث التقيؤ بدون إشراف طبي متخصص وكذلك عدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم إذا كان المصاب غائبا عن الوعي.
عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس إصطناعي عن طريق الفم، وينقل بسرعة إلى المستشفى.
عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء والصابون، ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
عند إصابة العين: تغسل العين بكمية كبيرة من الماء الجاري لمدة ١٥ دقيقة.
تعليمات للأطباء: استعمال القسطرة للرئة خلال عملية تفريغ المعدة، يحقن المصاب في الوريد أو العضل بمقدار ٢-٤ ملغم سلفات الأتروپين ويكرر الحقن كل ١٠ دقائق عند اللزوم.
لا تستخدم أنواع الأوكسيمات مثل 2PAM.
إذا لامس المبيد العينين تستعمل قطرة واحدة من الهيموتروپين لكل عين.

شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية "أستراكيم"



شركة أسترا الزراعية

الرياض - هاتف: ٤٧٧٢٣٤٦ فاكس: ٤٧٨٢١٠٢ شارع سلام: ٤١١٨٢٩٠
جدة: ٠٢٦٣٠٢١٧٩ الدمام: ٠٣٨١٧١٦٨١ الخرج: ٠١٥٥٠١٦٣٦
بريدة: ٠٦٣٨١٤٢٣٥ حائل: ٠٦٥٤٣٣٩٩١ نجران: ٠٧٥٤٤٣٦٦١
تبوك/ الجوف: ٠٥٥٢٩١٧٠١ وادي الدواسر: ٠٥٥٢٩١٦٥١
صنع في المملكة العربية السعودية
www.astra-agri.com.sa

Montsan® 200ULV مونتسان

ULV

Recommendations for Use

PHI	Application Rate	Pest
-----	------------------	------

(*Locusta migratoria, Schistocerca gregaria*)

(Atropine sulfate)

